

ACERIL® - Captopril Dextxon Tablets

Patient package insert according to Pharmacists' Regulations (Preparations), 1986.

This medicine is to be dispensed upon physician's prescription only.
Carefully read the entire package insert before using this medication.

Composition: Each tablet contains:
Aceril® 12.5 Captopril Dextxon: Captopril 12.5 mg
Aceril® 25 Captopril Dextxon: Captopril 25 mg
Aceril® 50 Captopril Dextxon: Captopril 50 mg

Inactive ingredients: Cellulose microcrystalline; lactose monohydrate; starch pregelatinized; stearic acid.

Therapeutic group: Aceril® is a vasodilator of the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor type.

Therapeutic action: Aceril® is indicated for the treatment of hypertension, congestive heart failure and diabetic nephropathy. Following heart attack - reduction of the incidence of congestive heart failure.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to one of its ingredients or to other medications of the same family.
Do not use this medicine if you have suffered a reaction which included swelling of the hands, face, lips or tongue of unknown origin.

Do not use this medicine without consulting your physician before commencing treatment: If you are suffering from a collagen vascular disease such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus or scleroderma.
If you suffer, or have suffered in the past, from impaired function of the heart, the kidney, from hyperkalemia (excessive potassium in the blood). If a physician told you in the past that you have intolerance to certain sugars, refer to your physician before starting treatment with this medicine.

How will this medicine influence your daily schedule? In certain patients this medicine may cause dizziness or lightheadedness. If you experience these effects after taking the medicine, exercise caution when driving a car.

Warnings: During treatment with this medicine, the following tests should be performed: blood, urine, kidney function, liver function, and monitoring of blood pressure. If you are aware of any sensitivities to foods or drugs inform your physician before taking this medicine. If you are about to undergo any surgery (including dental surgery) or any procedure involving anesthesia, inform the anesthesiologist that you are taking this medicine. Inform your physician if you are to have desensitisation treatment for bee or wasp stings, if you are undergoing or about to undergo dialysis. Inform your physician before you are to undergo blood or urine tests. Aceril® may distort the results of these tests. Do not become pregnant during treatment with this medicine. Consult your physician regarding appropriate contraception. If you become pregnant during treatment with this medicine, inform your physician immediately. Occasionally, the first one or two doses may cause dizziness or fainting. If this happens, lie down until it passes. It is recommended that you take the medicine in a sitting position. Avoid becoming dehydrated or sweating excessively. Refer to your physician in cases of recurrent vomiting or severe and continuous diarrhea as these conditions could lower blood pressure even more. Increased physical activity may cause weakness, especially in hot weather. Consult your physician about the amount of physical activity that is safe for you (especially patients with congestive heart failure).

Drug interactions: If you are taking other medicines concurrently, or have just completed treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions, especially in regard to medicines for cold, cough, hay fever or sinus problems (these medicines may raise your blood pressure), antidiabetic

أسيريل® - كابتوپريل دكسون أقراص

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦.

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب.
اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

التكوين: كل قرص يحتوي على:
أسيريل® ١٢,٥ كابتوپريل دكسون: Captopril 12.5 mg
أسيريل® ٢٥ كابتوپريل دكسون: Captopril 25 mg
أسيريل® ٥٠ كابتوپريل دكسون: Captopril 50 mg

المواد غير الفعالة: Cellulose microcrystalline; lactose monohydrate; starch pregelatinized; stearic acid.

الفصيلة العلاجية: أسيريل® ينتمي إلى فصيلة الأدوية الموسعة للأوعية الدموية من نوع مثبطات الخمائر التي تحول الضغط الورياني.

تأثيرات الدواء الطبية: أسيريل® مخصص لمعالجة ضغط الدم العالي، قصور القلب والإعتلال الكلوي الناتج عن السكري. للعلاج بعد نوبة قلبية - تقليل عدد حوادث قصور القلب.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعمل هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.
لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لأدوية أخرى من نفس الفصيلة. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا عانيت من رد فعل يشمل إنتفاخ في اللين، الوجه، الشفتين أو اللسان من مصدر مجهول.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً: إذا كنت تعانين/ن من مرض النسيج الضام كالتهاب المفاصل الروماتزمي، الذئبة الإحمرارية الجهازية (لويوس) أو تصلب النسيج الضام (تصلب الجلد). إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب، الكلى، زيادة نسبة اليوتاسيوم في الدم. إذا قبل لك في الماضي من قبل طبيب أنه لديك عدم تحمل لأنواع معينة من السكريات، يجب إستشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟
قد يسبب هذا الدواء لدى مرضى معينين الدوار أو التشوش إلى درجة الإغماء. فإذا شعرت بأعراض كهذه بعد إستعمال الدواء، عليك الإحتراس عند قيادة المركبات.

تحذيرات: يجب إجراء الفحوص الطبية أثناء فترة تناول هذا الدواء للدم، للبول، ووظيفة الكلى، ووظيفة الكبد ومراقبة ضغط الدم.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء. يجب إبلاغ الطبيب المخدر عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً/ة على إجراء أي عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) أو كل معالجة طبية تتطلب التخدير. يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت على وشك تلقي علاجاً مضاداً للحساسية عند لسع دبور أو نحلة، إذا كنت تجتاز/ين أو على وشك إجراء عملية الأدليزة. ابلغ/ي الطبيب قبل أن تجتاز/ي فحوص الدم أو البول. أسيريل® قد يعرقل من نتائج هذه الفحوص. لا يجوز الحمل أثناء العلاج - يجب إستشارة الطبيب بشأن إستعمال وسائل ملامسة لمنع الحمل - إذا حصل الحمل أثناء العلاج - يجب مراجعة الطبيب حالاً. قد يؤدي تناول الجرعة الأولى أو الجرعتين الأولىين لهذا الدواء إلى الدوار أو الإغماء أحياناً. إذا حدث لك هذا، عليك الإستلقاء حتى زوال الدوار أو الإغماء. يوصى بتناول الدواء وأنت في حالة الجلوس. يجب الحرص على عدم الوصول إلى حالة الجفاف أو التعرق الزائد. يجب مراجعة الطبيب في حالة التقيؤ المتكرر أو الإسهال الشديد والمستمر. قد تؤدي هذه الحالات إلى إنخفاض كبير في ضغط الدم. كما أن النشاط الجسماني المتزايد قد يسبب الضعف العام، خاصة في الجو الحار. يجب إستشارة الطبيب بشأن ما يتعلق بكمية الأنشطة الجسمانية المسموحة لك (خاصة لدى المرضى ذوي القصور القلبي).

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، ف يجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: أدوية الرشح، سعال، حمى العلف أو لأضطرابات الجيوب الأذنية (هذه الأدوية قد ترفع ضغط الدم)، أدوية السكري، مخفضات ضغط الدم، مدرات بولية.

أسيريل® - كفتوپريل دكسون تابلتس

علون לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.

תרופה זו חייבת במרשם רופא.

יש לקרוא בעיון את הילון עד סופו לפני השימוש בתרופה.

הרכב: כל טבליה מכילה:

אסריל® 12.5 קפטופריל דקסון: Captopril 12.5 mg
אסריל® 25 קפטופריל דקסון: Captopril 25 mg
אסריל® 50 קפטופריל דקסון: Captopril 50 mg

מרכיבים בלתי פעילים: Cellulose microcrystalline; lactose monohydrate; starch pregelatinized; stearic acid.

קבוצה תרופתית: אסריל® שייך לקבוצת התרופות מרחיבי כלי הדם מסוג מעכבי אנזים מהפר אנגיוטנסין (ACE Inhibitor).

פעילות רפואית: אסריל® מועד לטיפול ביתר לחץ דם, אי ספיקת לב ונפרופתיה סכרתית. לטיפול לאחר התקף לב - הקטנת מספר הארועים של אי ספיקת לב.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמש בתרופה כאשר הינך בהריון או מיניקה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מאותה משפחה. אין להשתמש בתרופה אם סבלת מתגובה הכוללת נפיחות בידים, פנים, שפתיים או לשון ממקור לא ידוע.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך סובלת/ת ממחלת רקמת חיבור, כגון דלקת מפרקים שיגרונתית, זאבת אדמנית מערכתית (לופוס) או טרשת רקמת חיבור (סקלרודרמה).
אם הינך סובלת/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב, הכליה, היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם), אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לסחרחורת או טשטוש. אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עליך להיזהר בנהיגה ברכב.

אזהרות: בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן, תפקוד כליה, תפקוד כבד ומעקב על לחץ דם. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם הינך עומדת/ת לפני ניתוח כלשהו (כולל ניתוח דנטלי) או כל פעולה המרכיבה בהרדמה, יש לדווח לרופא המרדים על נטילת תרופה זו. יש לדווח לרופא אם הינך עומדת/ת לקבל טיפול נגד רגישות לעקיצות צרעה או אדורה, אם את/ה עוברת/ת או עומדת/ת לעבור דיאליזה. דווח/י לרופא לפני שהינך עומדת/ת לעבור בדיקות דם או שתן. אסריל® עלול לשבש תוצאות בדיקות אלו. אין להרות בתקופת הטיפול - יש להיוועץ ברופא על שימוש באמצעי מניעה נאותים. אם הרית בתקופת הטיפול - יש לפנות לרופא מיד. לעיתים, המנה הראשונה או השתיים הראשונות עלולות לגרום לסחרחורת או לעלפון. אם זה קורה לך, שכב/י עד שיעבור. מומלץ ליטול במצב שיבה. יש להיזהר לא להגיע למצב של התייבשות או הזעת יתר. במקרה של הקאות חוזרות או שלשול חריף ומתמשך, יש לפנות לרופא. מצבים אלו עלולים להוריד במידה רבה יותר את לחץ הדם. פעילות גופנית מוגברת עלולה לגרום לחולשת, במיוחד במזג אוויר חם. יש להתייעץ עם הרופא לגבי כמות הפעילות הגופנית הבטוחה שבבילך (במיוחד חולים עם אי ספיקת לב).

תגובות בין תרופות: אם הינך נוטלת/ת תרופה נוספת, או אם סימנת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הובעים מתגובות בין תרופות, במיוחד לגבי תרופות מקבוצות הבאות: תרופות להצטננות, שיעול, קורחת-השתח או לבניות טיפוס (תרופות אלו עלולות לעלות את לחץ הדם), תרופות לסכרת, תרופות להורדת לחץ דם, משתנים, תוספות אשלגן

See next page

בית

המשך מעבר לרך



אסריל® - קפטופריל דקסון טבליות

המשך

או כל מוצר אחר שעלול לעלות את רמת האשלגן בדם, תכשירים אנטי דלקתיים שאינם סטרואידים (כגון אינדרומטצין, איבופרופן), אלופורינול (לשיגור), פרוקאיןאמיד (לטיפול בקצב לב בלתי-סדיר), ליזיום, מדאמי מערכת החיסון (אזתיופרין), ציקלופוספמיד, חלק מהתרופות האנטי דיכאוניות מהדור הישן ותרופות אנטי-פסיכוטיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: שינוי ובלטות נפוחות, איבוד חוש הטעם, סחרחורת, גרוד בעור, אדמומית (סומק), נשירת שיער, ידיום ורגליים קרות, תחושת עקצוץ, יובש בפה, אנורקסיה, קלקול קיבה, כאב בטן, שלשול או עצירות, הפרעות שינה, נמנום, כאבי ראש, תחושת חולי, ותחושה כללית לא טובה. אם תופעות אלו נמשכות או מטרידות, יש לפנות לרופא.

תופעות הממייכות התייחסות מיוחדת: סחרחורת חמורה או חולשה, פריחה, צריבה או אדמומית בעור או קולרף עורני אשר הופיעו בפתאומיות וללא סיבה ברורה, חום, קוצר או קשיים בנשימה, כאב גרון, עלפון, נפיחות בידיים, בפנים, בשפתיים או בלשון, אי סדירות בקצב הלב או קצב לב מהיר באופן חריג, כאבי בטן חמורים, צהבת (צהבהב העור או העיניים) - יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד! יש דיווחים נדירים מאוד על תופעות לוואי של בלבול, דיכאון, טשטוש בראיה, נזלת, כאבים בחזה, התקף לב, שבץ, כיבים בקיבה, הפרעות בעור כולל חיזרון העור, רגישות העור לאור, פצעים וכיבים בפה, כאבי שרירים ופרקים, אין אונות, נפיחות בחזה, תשישות, שנייים בתוצאות בדיקות דם וברמת סוכר בדם. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: מינון לפי הוראות הרופא בעל לב. אין לעבור על המנה המומלצת. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש לדלג על מנה זו וליטול את המנה הבאה בזמן הקצוב הרגיל, בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד! **שימו לב!** בתקופת הטיפול בתרופה אין להשתמש במלח דל נתרן.

אופן השימוש: ניתן לחצות ו/או לכתוש את הטבליה.

אי כיצד תוכלו/י לסייע בהצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

מנעו/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעו/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא ותופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. בחולה אחר/ת הוא עלולה להזיק. אין לנתת תרופה זו לקרוביך, שכניך, או מכריך. אין ליטול תרופות בחושיך יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר. יש לסגור היטב ולמנוע חדירת אוויר ורטיבות. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מאובחנת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מסי רישום התרופה: **אסריל® 12.5 קפטופריל דקסון:** 106 49 29061 00
אסריל® 25 קפטופריל דקסון: 106 50 29062 00
אסריל® 50 קפטופריל דקסון: 106 51 29063 00

פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

אסריל® - קאפטופריל דקסון אפרוא

תמצ

יזאפאת הבוטאסיום או כל מנתג אחר قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، مستحضرات لا سטריוידיה مضادة للإلتهاب (كالإينדומיתאסין، איבופרופן)، האופורינול (للنقرس)، پروקאיןאמיד (لمعالجة عدم إنتظام وتيرة خفقات القلب)، ليتيوم، مثبطات جهاز المناعة (أزاثيوپرين، سيكلوفوسفاميد)، قسم من الأدوية المضادة للإلتهاب النفسي من الدور القديم والأدوية المضادة للإضطرابات الذهانية النفسية.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كالسعال وإنتفاخ الغدد، فقدان حاسة الذائق، دوام، حكة في الجلد، إحمارة، تساقط الشعر، برودة اليدين والرغطين، الشعور بالوخز، جفاف الفم، فقدان الشهية للطعام، فساد المعدة، ألم في البطن، إسهال أو إمساك، إضطرابات في النوم، غثاس، صداع، الإحساس بالمرض والإحساس العام بحالة غير جيدة. إذا إستمرت هذه الأعراض أو إذا كانت مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً: دوام خطيري أو ضعف عام، طفح جلدي، حرقة أو إحمارة الجلد أو تقشر الجلد والتي تظهر بشكل فجائي وبدون سبب واضح، سخونة، قصر أو صعوبة في التنفس، ألم في الحنجرة، إغماء، إنتفاخ في اليدين، الوجه، الشفتين أو اللسان، عدم إنتظام وتيرة خفقات القلب أو وتيرة خفقات القلب سريعة بشكل شاذ، آلام خطيرة في البطن، يرقان (إصفرار الجلد أو العينين) - يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً؛ هناك تقارير نادرة جداً عن ظهور أعراض جانبية لإرتباك، إكتئاب نفسي، تشوش الرؤية، رشح، آلام في الصدر، نوبة قلبية، سكتة، تقرحات في المعدة، إضطرابات في الجلد وتشمل شحوب الجلد، حساسية الجلد للضوء، جروح وتقرحات في الفم، آلام في العضلات والمفاصل، عجز جنسي، إنتفاخ في الصدر، إرقاق، تغيرات في نتائج فحوص الدم ونسبة السكر في الدم. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الوصى بها. هذا الدواء غير مخصص للإستعمال عادة لدى الأطفال والرضع.

إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعين، فعليك تقوية هذه الجرعة وتناول الجرعة القادمة في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

إنتبه/ي! لا يجوز إستعمال الملح الفقير بالصوديوم أثناء فترة العلاج بالدواء.

إرشادات الإستعمال: بالإمكان شطر القرص إلى نصفين و/أو سحق القرص.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب إكمال العلاج الوصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع. وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. إذا أقرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب: هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب القيء لمرضى آخر. لا تعط/ي من الدواء إلى أطفالك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد. أغلق/ي العبوة بإحكام لمنع نفاذ الهواء والرطوبة إليها. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: **أسرييل® 12.5** كابتوپريل دكسون: 106 49 29061 00

أسرييل® 25 كابتوپريل دكسون: 106 50 29062 00

أسرييل® 50 كابتوپريل دكسون: 106 51 29063 00

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحوص ورخص من قبلها.

ACERIL® - Captopril Dexxon Tablets

Continued

agents, antihypertensives, diuretics, potassium supplements, or any other product that may raise your blood potassium level, non-steroidal anti-inflammatory drugs (e.g. indomethacin, ibuprofen), allopurinol (for gout), procainamide (for treatment of irregular heartbeat), lithium, immunosuppressants (azathioprine, cyclophosphamide), some old generation antidepressants, and antipsychotics.

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, some side effects may appear during treatment, such as: cough and swollen glands, loss of taste sensation, dizziness, itchy skin, redness (flushing), hair loss, cold hands and feet, stinging sensation, dryness of the mouth, anorexia, stomach upset, abdominal pain, diarrhea or constipation, sleep disturbances, drowsiness, headache, feeling sick, a general unwell feeling. If these effects are persistent or bothersome, refer to your physician.

Side effects requiring special attention: Severe dizziness or weakness, skin rash, burning sensation, redness or peeling that appear suddenly and without any clear cause, fever, shortness of breath or difficulty breathing, sore throat, fainting, swelling of the hands, face, lips, or tongue, unusually rapid or irregular heart beat, severe abdominal pain, jaundice (yellowing of the skin or eyes) - discontinue treatment and contact your physician immediately! There have been very rare reports of confusion, depression, blurred vision, runny nose, chest pain, heart attack, stroke, stomach ulcers, skin problems including pale skin, sensitivity of the skin to light, mouth sores and ulcers, muscle and joint pain, impotence, swelling of the chest, fatigue, changes in blood test results and in blood sugar levels. If you experience side effects not mentioned in this insert, or if you feel any change in your general health, contact your physician immediately.

Dosage: Dosage according to physician's instructions only. Do not exceed the recommended dosage.

This medicine is usually not intended for children and infants.

If you have forgotten to take a dose at the specified time, skip the dose and take the next dose at the usual scheduled time. Never take two doses together!

Attention! Do not use low-sodium salt during treatment with this medicine.

Directions for use: The tablet can be halved and/or crushed.

How can you help this treatment succeed?

Complete the entire course of treatment as directed by your physician.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue treatment with this medicine without consulting a physician.

Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine should be kept in a closed place out of the reach of children and/or infants to avoid poisoning. If you took an overdose, or if a child accidentally swallowed this medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the medicine package with you.

Do not induce vomiting without explicit instructions from a physician!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment. In another patient it may cause harm. Do not give this medicine to relatives, neighbours or friends.

Medicines should not be taken in the dark! Check the label and the dose every time you take this medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a cool place. Close well to avoid penetration of air and moisture. Even if kept in their recommended storage conditions, drugs retain their potency for a limited period only. Please note the expiry date of this medicine. If in doubt, consult with the dispensing pharmacist. Do not store different medicines in the same container.

Registration number of the drug: **Aceril® 12.5 Captopril Dexxon:** 106 49 29061 00

Aceril® 25 Captopril Dexxon: 106 50 29062 00

Aceril® 50 Captopril Dexxon: 106 51 29063 00

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health (MOH) and its content was checked and approved by the MOH.



DEXCEL LTD. A DEXON COMPANY

Or-Akiva, P.O.B. 50, Hadera 38100, ISRAEL

דקסל מ.צ. מן جماعة دكسون

أور-عقبا، ص.ب. 50، الخضيرة 38100، إسرائيل

דקסל בע"מ מקבוצת דקסון

אור-עקיבא, ת.ד. 50, חדרה 38100, ישראל