

לואי כגון: יובש בפה, בחילה, הקאה, שלשול, אי נוחות בקיבה, חוסר מנוחה. אם תופעות הלואי מתמשכות או מטרידות יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

תופעות המסייבות התייחסות באזהרה:

לאנשים מסוימים תרופה זו יכולה לגרום לנימנום, עייפות או סחרחורת, אם חשת באחת מתופעות אלו לאחר השימוש בזילרג'י, יש להימנע מכל פעילות המסייבת ערות כגון: נהיגה ברכב, אי הפעלת מכונות מסוכנות. כאשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכניש וכדומה.

אם את/ה חש/ה באחת מתופעות לואי אלו יש לפנות לרופא מיד. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה בכאבי ראש, עייפות, סחרחורת, נמנום רציני, שיעול, ציפוצים או קשיי נשימה, כאב גרון או כאב בזמן הבליעה, כאב בבטן, דימום מהאף או בתופעות לואי שלא צויינה בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד.

תופעות לואי ותגובות בין תרופתיות בילדים:

על הורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה ראה/י לעיל תופעות לואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו

תכשיר זה אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא. למבוגרים וילדים מגיל 6 שנים ומעלה: קפליה 1 ליום.

אין לעבור על המנה המומלצת, אם התסמינים נמשכים, יש להיוועץ ברופא. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אולם אין זמן נטילת המנה הבאה קרוב, יש לדלג על המנה שנשכחה ולהימנע לזמני הנטילה הרגילים. **בשום מקרה אין ליטול שתי מנות ביחד!**

אופן השימוש:

בלעו את התרופה עם מים, אפשר עם אוכל ניתן לכתוש וניתן לחצות.

מנעי הרעלה:

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מה תרופה יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים, ולהביא אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! **אין ליטול תרופות בחושי!** יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוסף/ת תרופה יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

במקום קריר ויבש/האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות מרורות לתקופה גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות מרורות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר/ בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מי רישום התרופה: 116432983300

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי.

דקסל* בנימ מקבוצת דקסון*
אור-עקובא, ת.ד. 50 חדרה 38100, ישראל

דקסל* מ.צ.מ. מ.צ.מ. מ.צ.מ. דקסון*
אור-עקובא, ת.ד. 50 חדרה 38100, ישראל

Если эти побочные явления не прекращаются или беспокоят - прекратите лечение и обратитесь к врачу

Явления, требующие особого внимания: У некоторых пациентов этот препарат может вызвать сонливость, усталость или головокружение.

Если Вы испытывали один из перечисленных симптомов после приема препарата Зиллержи - следует избегать всех видов деятельности, требующих бдительности, таких как вождение машины или работа с опасным оборудованием. Следует предостеречь детей от катания на велосипеде или игр вблизи проезжей части и т.п.

Если Вы испытывали один из перечисленных симптомов - следует незамедлительно обратиться к врачу.

В каждом случае, когда Вы испытываете головную боль, судороги, головокружение, сильную сонливость, кашель, одышку или затрудненное дыхание, боль в горле или боль при глотании, боль в животе, кровотечение из носа или побочные эффекты, не упомянутые в этой инструкции, или произошло изменение в общем самочувствии - прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу

Побочные реакции и взаимодействие препаратов у детей: Родители должны сообщить лечащему врачу о каждом побочном эффекте и о любом другом препарате, принимаемом ребенком. См. специфические побочные эффекты и взаимодействие препаратов, описанные выше

Дозирование: Препарат не предназначен для приема детьми младше 6 лет. Рекомендуемая доза для взрослых и детей 6 лет и старше, при отсутствии иных указаний врача: по 1 каплету в день. Не превышайте рекомендуемые дозы. Если симптомы не купируются - проконсультируйтесь с врачом. Если Вы забыли принять препарат в положенное время - примите его, как только вспомните, однако если приближается время следующего приема препарата - не принимайте пропущенную дозу и продолжайте принимать препарат в обычном режиме. **Ни в коем случае не принимайте сразу двойную дозу!**

Указания к применению: Проглатывать препарат запивая водой. можно во время еды. Препарат можно измельчать и можно делить надвое

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, подлежит хранению в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Если принята большая доза, или ребенок по ошибке проглотил этот препарат - немедленно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку препарата. **Не вызывайте рвоту** без получения точных указаний врача! **Лекарства нельзя принимать в течение!** Проверьте надписи и дозу каждый раз перед приемом препарата. При необходимости пользуйтесь очками

Хранение: Хранить в прохладном и сухом месте. Даже при хранении в рекомендуемой упаковке/рекомендуемых условиях препараты имеют ограниченный срок годности. Обратите внимание на срок годности препарата! В случае сомнения - проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат. Не храните разные препараты в одной упаковке

Регистрационный номер препарата: 116432983300

Формат этой инструкции утвержден Министерством здравоохранения, которое проверило и одобрило содержание.

diarrhea, upset stomach, agitation. If these effects persist or are bothersome, discontinue treatment and contact your physician. **Side effects requiring special attention:** In some people this medicine may cause drowsiness, tiredness or dizziness.

If you experience any of these effects after taking Zyllergy, avoid any activity that requires alertness such as: driving a car or operating dangerous machinery. As for children, they should be cautioned against bicycle riding or playing near traffic, etc. If you experience any of these side effects contact your physician immediately.

If you experience headache, convulsions, dizziness, severe drowsiness, coughing, wheezing or difficulty breathing, sore throat or pain when swallowing, abdominal pain, bleeding from the nose, or any side effect not mentioned in this insert, or if you feel any change in your general health, discontinue treatment and contact your physician immediately.

Side effects and drug interactions in children: Parents should report to the physician any side effects as well as any additional medicines taken by the child! See the above mentioned special side effects and drug interactions

Dosage: This medicine is not suitable for children under 6 years of age. The recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician, for adults and for children 6 years of age or older is: 1 caplet per day. Do not exceed the recommended dosage. If symptoms persist contact a physician. If you have forgotten to take a dose at the specified time, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Under no circumstances should two doses be taken together!

Directions for use: Swallow the medicine with water, possible with food. Crushing is allowed, halving is allowed

Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine should be kept in a closed place out of the reach of children and/or infants to avoid poisoning. If you took an overdose, or if a child accidentally swallowed this medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the medicine package with you.

Do not induce vomiting without explicit instructions from a physician! **Medicines should not be taken in the dark!** Check the label and the dose every time you take this medicine. Wear glasses if you need them

Storage: Store in a cool and dry place! Even if kept in their recommended storage conditions, drugs retain their potency for a limited period only. Please note the expiry date of this medicine. If in doubt, consult with the dispensing pharmacist. Do not store different medicines in the same container

Registration number of the drug: 116432983300

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health (MOH) and its content was checked and approved by the MOH

DEXCEL LTD. A DEXON COMPANY
Or-Akiva P.O. Box 50, Hadera 38100, ISRAEL

ДЕКСЕЛЬ*АТД из группы **ДЕКСОН***
Ор-Акива, почтовый ящик 50, Хадера 38100, Израиль

1292052128